

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ.

Υγρό διάλυμα λιπάσματος PK.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

| | |
|--|-----------|
| Φώσφορος (P ₂ O ₅), υδατοδιαλυτός | 7,4% β/β |
| Κάλιο (K ₂ O), υδατοδιαλυτό | 10,6% β/β |

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άλατα φωσφόρου και καλίου.

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 7,5 περίπου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,23Kg ± 2%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για να διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων.

LOT: - DATE:

ΠΡΟΣΟΧΗ



1L

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

TANISER®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το TANISER® είναι διάλυμα λιπάσματος φωσφόρου και καλίου που χρησιμοποιείται για την παροχή αυτών των κυρίων θρεπτικών συστατικών στο φυτό σε ιοντική μορφή, καθιστώντας τα έτσι διαθέσιμα για άμεση αλλά και μακροπρόθεσμη πρόσληψη από τα φυτά, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη ή/και θεραπεία των τροφολειών που σχετίζονται με την έλλειψη φωσφόρου και καλίου και τη βελτίωση της ευρωστίας του φυτού.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμόζεται διαφυλλικά σε Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι κ.ά), Φυλλώδη Λαχανικά (Μαρούλι, Σέλινο κ.ά), Σκόρδο, Κρεμμύδι, Πράσο, Πατάτα, Οπωροφόρα (Μηλιά, Αχλαδιά κ.ά), Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο), με δόση 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό.

Η συνιστώμενη δόση διαλύεται σε επαρκή ποσότητα νερού ώστε να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη κάλυψη της καλλιέργειας. Η σωστή βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής θεωρείται απαραίτητη.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με προϊόντα τα οποία έχουν ακραίες τιμές pH. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με προϊόντα που περιέχουν σίδηρο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο ή κοβάλτιο. Για κάθε πιθανή συνδυαστικότητα, συνιστάται η πραγματοποίηση μικρής κλίμακας δοκιμής.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγυόμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχο μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.α., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης, χωρίς να υπερβείτε τις αναγραφόμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ



**Premier
Shukuroglou**

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.

Ολύμπου 4, Λατσία 2234, Λευκωσία
P.O.B. 12508, 2250 -Latsia, Cyprus

Τηλ: +357 22815353-Fax:+357 22482331



Poligono Industrial Ingrulnsa
Av. D. Jerónimo Roure, Parc. 45
46520 Puerto Sagunto
Valencia · España

Tel. +34 962 691 090
Fax +34 962 690 963
servalesa@servalesa.com

www.servalesa.com

